

VÉCU ET ISSUE DES GROSSESSES INTRA-UTÉRINES CHEZ LES FEMMES PORTEUSES D'UN DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN AU CUIVRE

1 CONTEXTUALISATION



Les échecs contraceptifs existent : grossesses intra-utérines possibles

STERILET AU CUIVRE

Protection à long terme réversible

- Action double → Pas d'action sur l'ovulation
- Efficacité élevée → Indice de Pearl 0,6%
- Observance → Excellente
- Durée de vie → 5 ans
- Effets indésirables → Peu nombreux
- Tolérance → Bonne

Contraception la plus utilisée dans le monde




Problématique complexe : enjeux médicaux, psychologiques & éthiques

Objectif Explorer le ressenti des femmes sur le vécu d'une grossesse non désirée malgré le port d'un DIU au cuivre


2 METHODE

ETUDE QUALITATIVE


Analyse interprétative phénoménologique (IPA)




- Critères d'inclusion
- Femme adulte
 - Grossesse avec DIU au cuivre




- Entretiens individuels
- 12 entretiens semi-dirigés
 - Guide d'entretien – psychologue périnatalité
 - Retranscription manuelle
 - Anonymisation (E1, E2...)




- Sujet peu étudié
- Diversité de l'échantillonnage
 - Evolution du guide d'entretien
 - Satisfaction des participantes



- Biais de déclaration
- Biais de mémorisation
 - Chercheuses novices
 - Biais de subjectivité





- Analyse des données
- Double codage
 - étiquettes expérientielles
 - Interprétation des propriétés dégagées
 - Catégorisation des résultats



- Recrutement
- Médecin généraliste
 - Service hospitalier de gynécologie-obstétrique

3 RESULTATS

- Ressentis variés : de la surprise à la frustration, de la panique à la colère, parfois détresse émotionnelle
- Malgré le retrait du DIU : complications obstétricales observées (accouchements prématurés, fausses couches tardives, chorioamniotite)



4 CONCLUSION

→ Informer des risques d'échec du DIU

Prise en charge individualisée :

- Importance d'un accompagnement psychologique
- Besoin d'une surveillance médicale étroite (complications...)

Perspectives

Elargissement de l'échantillon pour confirmer ces premiers résultats
Développement de protocoles de suivi adaptés aux patientes concernées

